

# NHỮNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG NĂNG SUẤT LẠC

## 1. Mật độ gieo:

Đảm bảo đạt 36 - 40 cây/m<sup>2</sup>. Như vậy lượng giống cần thiết phải 240 kg/ha (12 kg/sào) và lên luống để gieo hạt. Luống rộng 1m gieo 4 hàng, hàng cách hàng 25cm, hốc cách hốc 18 - 20cm (gieo 2 hạt/ hốc) hoặc cây cách cây 9 - 10cm (gieo 1 hạt/ hốc).

## 2. Sử dụng giống tốt để gieo:

Giống tốt có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của lạc. Giống tốt ngoài yếu tố sạch sâu bệnh, tỷ lệ nảy mầm cao còn đòi hỏi phải cho năng suất cao, chất lượng tốt, kháng được bệnh héo rũ (chết ẻo).

Hiện nay, ở tỉnh ta trồng lạc chủ yếu sử dụng các loại giống chất lượng như MD7, L14, L18, L23. Nên sử dụng giống lạc liền vụ để gieo trồng, không nên sử dụng giống lạc để cách vụ, tỷ lệ nảy mầm thấp, làm giảm mật độ khi gieo sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

## 3. Sử dụng phân bón cân đối và hợp lý:

Lạc có thời gian sinh trưởng ngắn, vì vậy cần cung cấp phân bón đầy đủ, kịp thời mới cho năng suất cao.

Lượng phân bón cho lạc tùy theo đất tốt hay xấu mà lượng bón khác nhau. Để bón cho 1 ha như sau: Phân chuồng 8 - 10 tấn, vôi bột 400 - 500kg, đạm Urê 80 - 100kg, lân Supe 400 - 500kg, Kaliclorua 80 - 100kg. Hoặc thay đạm, lân, kali bằng NPK (5-10-3) 300kg/ha và NPK (16-6-8) 100kg.

Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân, 40 - 50kg đạm và 40 - 50kg kali. Hoặc NPK (5-10-3) 300kg/ha. Vôi bột rắc đều với lượng 200 - 250kg trước khi rạch hàng.

## Bón thúc được chia làm 2 lần:

- Bón lần 1 khi lạc 3 - 4 lá, kết hợp với xáo

làm cỏ phá váng và bón 40 - 50 g lượng đạm và kali còn lại. Hoặc NPK (16-16-8) 100kg/ha.

- Bón lần 2 khi lúa hoa đầu tàn, bón vôi xung quanh gốc hoặc theo hàng với 200 - 250kg lượng vôi còn lại kết hợp vun nhẹ đất vào gốc.

Đối với lạc trồng dày không nhất thiết phải vun cao gốc, chỉ cần làm cho đất xung quanh gốc tơi xốp, tạo điều kiện cho tia lạc đâm vào đất dễ dàng.

## 4. Thời vụ gieo:

- Vụ Đông Xuân: Gieo từ 15/12 đến 30/1.
- Vụ Xuân Hè: Gieo từ 1/2 đến 28/2.
- Vụ Hè Thu: Gieo từ 25/5 đến 10/6.
- Vụ Thu Đông: Gieo từ 15/8 đến 15/9.

## 5. Sử dụng Tiltsuper:

Phun vào thời kỳ lạc bắt đầu ra hoa và khi đâm tia nhằm kích thích sinh trưởng, trừ được một số bệnh hại lá, tăng khả năng hình thành và phát triển quả tạo năng suất lạc cao.

Sử dụng loại Tiltsuper 300 EC, hộp 10ml, với lượng 20 hộp/ha (1 hộp/sào) cho mỗi lần phun.

## 6. Phòng trừ sâu bệnh hợp lý:

- Sâu bệnh hại lạc thường gặp như: Sâu xám hại cây con, sâu khoang, sâu xanh ăn lá. Rệp, rầy chích hút, sâu hà cắn rễ cây lạc; bệnh chết ẻo hại chết cây và các bệnh hại lá khác.

- Phòng trừ sâu bệnh hại lạc có hiệu quả cần phải luân canh cây trồng, bón phân cân đối, sử dụng giống kháng bệnh và xử lý hạt giống trước khi gieo. Theo dõi sâu bệnh để phòng trừ kịp thời.

- Cần áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lạc đạt hiệu quả cao.

**TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN**

(Theo tài liệu tập huấn của Sở Nông nghiệp & PTNT)